


...pas de dents manquantes...





Origines possibles



Un accident arrive si vite...

...avec le vélo tous terrains on ne voit pas la racine
...en faisant du roller une pierre est sur le chemin
...on fait une chute et une dent manque.

Chez moi c'est arrivé en faisant du hockey sur glace.
Une seconde d'inattention et déjà j'avais la crosse
au visage et la dent perdue. On m'a dit qu'il y avait
beaucoup de raisons pour la perte de dents unitaires:

- **Blessures en faisant du sport**
- **Accidents de la circulation**
- **Accidents ménagers**
- **Accidents du travail**
- **Accidents à l'école**



Entant qu'entrepreneur qui a réussi, je fais attention à ma santé et à ma présentation. Pour cela il faut aussi de belles dents que je brosse bien et que je soigne aussi avec du fil dentaire et j'ai recours à des nettoyages professionnels.

J'étais vraiment abasourdi quand mon chirurgien-dentiste m'a déclaré après l'accident qu'il ne pouvait plus qu'enlever la racine et qu'une dent allait manquer – aurais-je le courage de me montrer ainsi?

Que l'on perde une ou plusieurs dents, avec des dents manquantes le sourire perd beaucoup de sa beauté.

Premiers secours après un accident impliquant les dents

- 1. Garder son calme!**
- 2. La dent peut tout aussi bien être tombée qu'avoir été enfoncée dans le maxillaire. Tout d'abord contrôler la cavité buccale pour voir si la dent s'y trouve. Danger d'ingestion et de suffocation!**
- 3. La dent a-t-elle été trouvée? En aucun cas ne toucher à la racine!**
- 4. Maintenir la dent humide et stérile – avec la boîte de sauvegarde de la pharmacie. Alternative: feuille de plastique, lait UHT ou solution isotonique de chlorure de sodium!**
- 5. Se rendre immédiatement chez le chirurgien-dentiste!**



Ne rien faire?



Perte d'une dent - que faire?

Me montrer avec une dent manquante, pour moi c'est hors de question. Ceci d'autant plus que j'ai en mémoire les explications de mon chirurgien-dentiste: toutes les dents contribuent à leur bonne tenue mutuelle et se donnent des impulsions. Quand une dent manque, les dents avoisinantes ont tendance à effectuer des migrations et basculent lentement.

Simultanément sur le maxillaire antagoniste, la dent opposée subit une égression car elle ne peut pas participer à la mastication ne trouvant plus de résistance. Finalement il y a perte de l'équilibre des forces en bouche.



Certes, ne rien faire revient le moins cher!

Mais est-ce la solution la plus saine? Mon chirurgien-dentiste m'a expliqué les alternatives. Il est possible de réaliser soit un bridge conventionnel, soit une prothèse à crochets, soit de poser un implant.

Dents manquantes
Ce qui est mignon et naturel chez les enfants peut avoir des conséquences malsaines chez les adultes:

- Douleurs dans les articulations des maxillaires
- Maux de tête
- Contractures chroniques
- Mal au dos
- Acouphènes
- Problèmes pour parler



Possibilités...

Bridge conventionnel

En prenant une rangée d'arbres pour exemple, mon chirurgien-dentiste m'a expliqué ce que signifie un bridge conventionnel pour les dents restantes.

Quand un des arbres est enlevé, il reste un trou dans la terre et apparaît un espace vide non protégé en hauteur. Pour refermer cet espace, dans le cas du bridge conventionnel, on enlève d'abord la couronne des arbres voisins. Ensuite on fixe des couronnes artificielles d'arbres sur les deux troncs qui supporteront la couronne de l'arbre central disparu.

En conséquence, les troncs d'arbres sont affaiblis par cette mesure. De plus, ils doivent encore porter le poids de la couronne du troisième arbre.

Il subsiste un danger latent qu'ils meurent relativement vite et doivent aussi être enlevés.

De surcroît, la terre sous la couronne centrale n'est plus protégée et maintenue par les propres racines de sorte à être exposée au vent et à la pluie sans aucune protection ce qui conduit au phénomène de l'érosion.

Le même phénomène se produit en bouche. Pour réaliser un bridge conventionnel, il faut meuler des dents saines. De surcroît elles peuvent subir une surcharge à long terme et en conséquence s'abîmer plus vite. Vu que les tissus osseux ne reçoivent plus d'impulsions fonctionnelles, il y a peu à peu une résorption osseuse sous la couronne – c'est comme pour les muscles lors de la fracture d'un bras.





Implants



La pose d'un implant correspond à la mise en place d'une racine artificielle. Cet implant portera plus tard la reconstitution et la couronne. On procède au forage d'un petit orifice dans le maxillaire où l'on visse ensuite l'implant. En raison de la surface rugueuse de l'implant, il épouse les tissus osseux en peu de semaines. Grâce à l'implant, les tissus osseux continuent à obtenir des impulsions fonctionnelles et se portent mieux. Ceci paraît bien préférable à des dents qui végètent sous un bridge. Voilà pourquoi je me suis décidé en faveur d'un implant.

Dans mon cas, lors de la pose de l'implant, celui-ci était si fortement ancré dans les tissus osseux, qu'il pouvait porter immédiatement une couronne provisoire en résine. L'avantage dans ce cas est que lors de la cicatrisation, la gencive s'est orientée d'après la couronne en épousant une forme naturelle.

Implant au lieu d'un bridge sur des dents meulées

- pas de meulage de dents saines
- Bonne conservation des tissus osseux
- Bonne conservation de la gencive

C'est pourquoi chez moi il n'a pas été nécessaire de procéder à une deuxième intervention chirurgicale. C'est uniquement dans les cas où une restauration immédiate n'est pas possible que l'on pose l'implant dans les tissus osseux et qu'on le recouvre de gencive. A l'aide d'un petit bridge collé aux dents voisines, on ferme provisoirement l'espace libre.

Après env. trois mois le chirurgien-dentiste dégage l'implant par une petite incision et y visse un pilier en titane servant à la mise en forme gingivale. Au bout de 2 semaines, la couronne définitive est terminée et on peut la mettre en place.

Quand je ris, personne ne s'aperçoit qu'un implant avec couronne remplace une dent naturelle.



1ère étape

Pour déterminer la qualité du maxillaire et des tissus osseux, il est en règle générale nécessaire de réaliser un examen radiologique. Quand les résultats sont satisfaisants, on peut procéder à l'implantation.

2ème étape

Pour l'intervention on procède à une anesthésie locale. Dans mon cas c'était une affaire d'env. 30 minutes. Je me suis rendu dans la salle de repos pour rafraîchir mon visage avec une compresse et limiter la tuméfaction au minimum. Au bout d'une heure environ, j'ai pu quitter le cabinet dentaire.

Je n'ai même pas eu besoin des antalgiques que mon chirurgien-dentiste m'avait donnés par mesure de précaution – car vraiment rien ne faisait mal. Dans certains cas il peut y avoir de légères tuméfactions et des hématomes qui disparaissent en quelques jours.

Etape par étape



3ème étape

Déjà le jour d'après, je pouvais à nouveau manger et boire normalement et on ne voyait presque plus les séquelles de l'intervention. Après une semaine la suture a été retirée et l'implant examiné.

Comme la restauration provisoire avait très bon aspect et que je m'y étais très bien habitué, j'ai laissé six mois s'écouler avant de faire réaliser la restauration définitive. Maintenant tout est terminé et je ne ressens presque pas de différence avec la dent perdue.

4ème étape

L'implant n'a pas seulement le même aspect que ma propre dent, il se laisse nettoyer et soigner tout aussi bien. Comme avant, j'utilise la même brosse à dent et le même dentifrice. Et pour moi l'utilisation du fil dentaire allait déjà de soi auparavant.

Les soins des espaces interdentaires sont particulièrement importants quand on porte des implants. C'est pourquoi je continue à me rendre régulièrement au cabinet dentaire pour un nettoyage professionnel.





Les meilleures chances



Un sourire rayonnant ouvre coeurs et portes

Avec l'implant je suis à nouveau celui que j'étais. Ceux qui ne savent rien de mon accident de hockey sur glace, ne voient aucune différence. La dent a la même apparence que ma propre dent et la gencive est toujours encore comme auparavant.

Je suis plus que satisfait. Maintenant j'ai regagné toute mon assurance. Et je peux faire confiance à mes dents pour toute ma vie. Au cas où il y aurait un problème, on peut reposer un nouvel implant.



Vos avantages en un coup d'oeil

- L'esthétique: de belles dents et une expression sympathique du visage
- Hygiène buccale comme pour les propres dents
- Soins simples
- La dent antagoniste et les dents avoisinantes trouvent contre-pression et tenue
- La mastication fonctionne comme avant
- Grande longévité



Questions et encore des questions

Que coûte une implantation?

L'implant unitaire était abordable. Mon chirurgien-dentiste m'a expliqué les différentes possibilités et leurs coûts. J'ai pu exprimer mes désirs en ce qui concerne les matériaux et le traitement.

Est-ce qu'une implantation est douloureuse?

En raison de la nouvelle technique chirurgicale, une plus grande intervention n'a pas été nécessaire et je n'ai pas eu de problèmes. Comme recommandé par le praticien, j'ai maintenu ma bouche froide après l'intervention. En résumé, je peux dire que les douleurs après l'intervention étaient moins importantes qu'après l'extraction de mes dents de sagesse.

Peut-il y avoir des réactions de rejet?

D'après les explications de mon chirurgien-dentiste, les implants dentaires sont réalisés en titane ou en zircone de haute qualité selon un procédé fastidieux en respectant la plus haute précision ainsi que des conditions de salle blanche avec une stérilisation subséquente. Entre temps la mise en oeuvre a fait ses preuves des millions de fois.

Frais

**Les implants coûtent environ
autant qu'un bridge sur des
dents meulées.**

Comment se produit une perte d'implant?

Mon chirurgien-dentiste m'a expliqué qu'il peut y avoir perte d'implant à la suite d'inflammations ou de fractures de la restauration prothétique. Pour éviter des inflammations, il suffit de procéder à un bon nettoyage à la maison et à une prophylaxie régulière au cabinet dentaire. Pendant la mastication et le nettoyage je veille toujours à une bonne assise de la prothèse et à ce que rien ne bouge. Quand je m'aperçois que quelque chose est anormal, je me rends tout de suite chez mon chirurgien-dentiste pour un contrôle.

Que se passe-t-il quand il a perte d'implant?

Dans ces cas là il se passe la même chose que lors de l'extraction d'une dent naturelle. En règle générale, il est possible de reposer un implant à la même place déjà au bout de six semaines. Le fabricant de mes implants propose même dans ces cas là un nouvel implant gratuit.

Que paient les caisses d'assurance maladie?

L'implantologie est une prestation d'ordre privé peu subventionnée par les caisses d'assurance maladie de l'état. Pour les patients ayant une mutuelle, la prise en charge est plus importante. Ceux qui ont une assurance complémentaire privée, perçoivent aussi des aides plus importantes. Le personnel du cabinet dentaire est compétent pour renseigner les patients sur leurs droits. Tous les documents seront étudiés pour faire percevoir au patient les aides qui lui sont dues.

...pas de dents manquantes...

Cachet du cabinet dentaire



0004210F-20210330



Coordonnées pour la France - bredent France:
T: +33 4 75 34 20 96 · F: +33 4 75 32 05 93
@: france@bredent.com

Coordonnées pour les autres pays francophones:
T: +49 7309 872-451 · F: +49 7309 872-444
@: info-medical@bredent.com

bredent medical GmbH & Co. KG · Weissenhomer Str. 2
89250 Senden · Germany
www.bredent-medical.com